potomac UROLOGY

Alexandria Location
4660 Kenmore Ave, Suite 1120
Alexandria, VA 22304

tel: 703-680-2111
fax: 703-878-3939

Woodbridge Location
2296 Opitz Blvd, Suite 350
Woodbridge, VA 22191

Alok Desai, M.D. Pratik Desai, M.D. Nilay Gandhi, M.D. John Klein M.D. Inderjit Singh M.D.

Instrucciones de stent Ureteral

¿QUE ES UN STENT?

- Mucha veces, un tubo con múltiples agujeros
- Permite la edad temporary drenaje Si los riñones es obstruido
- No es visible desde el exterior del cuerpo
- Permanece durante 1-2 semanas o large plazo durante varios meses.



PROCEDIMENTO

- No corte/incisiones se realizan en la piel
- Un camera se inserta en él uretra y la vejiga
- El stent se inserta y una radiografia confirma la posición

ACTIVIDAD

- Reanudar su rutina normal después de que se inserta el stent
- Resto si nota dolor o sangra en la orina con la activdad
- Está bien para participar en la actividad sexual

INSTRUCCIONES

- Beber 64 onzas de líquidos al día
- Si es prescrito, tomar medicación para el dolor, medicamentos espasmo, y/o un antibiótico como se indica.

SYMPTOMAS ESPERADOS

- Urgencia de orinar
- Frecuencia urinaria
- El ardor al orinar / disuria
- La sangre en la orina / hematuria
- Dolor cuando / después de orinar (atrás, de lado, de la ingle)

CUANDO TIENE QUE LLAMAR AL DOCTOR

- Fiebre > 100.5^{o} F y/o escalofríos
- Las náuseas/vómitos
- Orina turbia, coágulos de sangre
- No puede orinar, goteo urinario
- El dolor no controlado con la medicación

CUAIDAD DE SEGUIMIENTO

- El stent ureteral **NO ES PERMANENTE.** Debe ser eliminado / cambiado por lo que puede enfermarse gravemente o dañar permanentemente su riñón
- Por favor, consultar el plan para el stent con su urólogo **dentro de 1-2 semanas** de la colocación